

**PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL
TUBERCULOZEI**

Unitatea de Asistenta Tehnica si Management

Tel. / Fax: + 40 21 337 45 87

E-mail: programtb@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

Mai este tuberculoza o problema de sanatate publica in Romania?

In ultimii 10 ani, in Romania s-au inregistrat progrese importante in controlul bolii: incidenta globală a TB (cazuri noi și recidive) a scăzut cu 48,7%, de la un maximum de 142,2‰ în anul 2002 la 73,3‰ în anul 2013, iar ceilalti indicatori de impact s-au imbunatatit considerabil: mortalitatea a scăzut cu 49%, de la 10,8‰ în anul 2002 la 5,9‰ în anul 2013 si incidenta TB la copiii cu varste cuprinse între 0 - 14 ani a scăzut cu 51%, de la 48,2‰ în anul 2002 (1843 cazuri) la 22,3‰ în anul 2013 (708 cazuri).

Tuberculoza chimiorezistentă pune, inasa, serioase obstacole în controlul TB în întreaga lume. Daca tuberculoza cu tulpini sensibile se vindeca în Romania în procent de peste 86%, cea cu tulpini rezistente la Isoniazidă si Rifampicină are șanse de vindecare destul de reduse, sub 50%.

Cu toate că tuberculoza este o boală ce își face simțită prezența de milenii, agentul microbian incriminat drept cauză a fost descoperit în urmă cu mai bine de 130 de ani de catre Robert Koch , chimio-antibioticele încep practic să fie utilizate de la începutul anilor '50 ai secolului trecut. Tuberculoza a continuat sa rămâna un pericol permanent pentru populație, o problemă prioritară de sănătate publică a unui însemnat număr de țări. Deși, în timp și în lume s-au înregistrat numeroase progrese în combaterea tuberculozei, aspectele inedite de ordin medico-social pe care le generează constant boala impun o fermitate fără precedent a măsurilor de limitare, reducere și în final eliminare a acesteia.


Anual, în lume mor 1,3 milioane de oameni din cauza tuberculozei. O persoană contagioasă, care nu știe acest lucru, poate transmite infecția altor 10-15 persoane într-un an.

TB este a 7-a cauză de deces la nivel mondial, 1/3 din populația globului fiind infectată.

În 2012 s-au înregistrat 1,4 milioane de decese prin TB, echivalând cu 3800 de decese/zi.

Anual se apreciază că apar 8,6 milioane de cazuri noi, incidența globală la nivel mondial fiind de 125‰, cu cele mai multe cazuri înregistrate în Asia (59%) și Africa (26%).


Tuberculoza la nivel mondial – 2012, pe regiuni



Deși România s-a situat, din punctul de vedere al incidenței globale a TB, pe primele locuri în Regiunea Europa OMS (locul 6 în anul 2009, după Kazakhstan, Republica Moldova, Georgia și Kirgizstan), ocupând chiar primul loc printre țările membre ale Uniunii Europene încă de la aderarea sa în 2007, în ultimii ani s-au înregistrat progrese importante în controlul bolii. Aceasta este, în primul rând rezultatul implementării în România a strategiei DOTS recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru controlul TB care are o acoperire de 100% încă din anul 2005.

Incidența globală (IG) a TB (cazuri noi și recidive) a scăzut în ultimii 10 ani cu 48,7% de la un maximum de 142,2‰ în anul 2002, la 82,6‰ în anul 2011 și 73,3‰ în anul 2013.

INCIDENȚA GLOBALĂ A TB (IG) ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1972 – 2013



În vederea creșterii controlului TB în conformitate cu Strategia de țară preconizată pentru perioada 2013-2017, se urmărește a se acorda prioritate următoarelor măsuri din Programul Național de Supraveghere „Prevenire și Control al Tuberculozei realizat sub coordonarea Ministerului Sănătății:

- Introducerea progresivă într-un număr limitat de laboratoare performante, a tehnicii moleculare rapide capabilă a depista în timp mai scurt TB și chimiorezistențele
- Procurarea prin procedură de achiziție centralizată a medicamentelor anti-tuberculoase
- Măsuri riguroase de reducere a transmiterii infecției tuberculoase în rândul populației generale prin implementarea măsurilor de control al infecției TB.
- O mai bună integrare a copiilor în practici standard de control al tuberculozei
- Perfecționarea continuă a sistemului standardizat de înregistrare și raportare implementat și bazat pe analiza de cohortă trimestrială
- Creșterea implicării tuturor furnizorilor de servicii medicale în controlul TB (neguvernamentale și private), cu asigurarea aderenței acestora la standardele oficiale de asistență a tuberculozei


• Încurajarea pacienților cu TB și a comunităților în scopul combaterii bolii tuberculozei.

• Facilitarea și promovarea cercetării în domeniul tratamentului, diagnosticului și profilaxiei tuberculozei cu impact asupra performanțelor PNSPCT.

În ceea ce privește numărul de cazuri noi și recidive înregistrate anual și acesta a scăzut cu 15.355 de la 30.984 în 2002 la 15.629 în 2013.


În concordanță cu tendința favorabilă a endemiei TB din țara noastră din perioada ultimilor ani, incidența TB la copiii între 0 și 14 ani a scăzut în mod semnificativ, de la 48,2‰ în anul 2002 (1843 cazuri) la 22,3‰ în anul 2013 (708 cazuri).

INCIDENȚA TB LA COPII ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2005 – 2013
WHO REPORT 2010 Global TB Control
NTP, NATIONAL DATA BASE



Mortalitatea a scăzut de la 10,8‰ în anul 2002 la 5,9‰ în anul 2013. Așa acum se vede din dinamica indicatorilor sus-menționați, tuberculoza cu germeni sensibili are un trend descendent în România..

MORTALITATEA PRIN TB ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1990 – 2012




Rata de succes terapeutic la cazurile sursă (microscopic pozitive) se menține constant peste 83% în ultimii ani.

O problemă de importanță epidemiologică majoră o reprezintă extinderea TB chimiorezistente în SUA și Europa ceea ce a condus la concentrarea atenției internaționale asupra problemei acestei forme de TB. TB chimiorezistentă pune serioase obstacole în controlul TB în lume. Tulpinile chimiorezistente sunt la fel de contagioase ca și cele sensibile.

TB cu tulpini sensibile se poate vindeca în procent de peste 95%, dar cea cu tulpini rezistente la Isoniazidă sau Rifampicină are șanse de vindecare sub 56%.

**NUMĂRUL DE PACIENȚI MDR/XDR – TB CU LOCALIZARE PULMONARĂ
ÎNREGISTRAȚI ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA
2008 -2013**



În România, datele rezultând din notificarea cazurilor MDR din anii 2008 și 2013 atestă o tendință de scădere a acestora, dar trebuie să avem în vedere faptul că doar 63% din examenele bacteriologice au confirmare în culturi și doar 53% au efectuată ABG.

Dr. Georgeta Gilda Popescu

Coordonator tehnic național al PNPSCT